

Quatrième rapport sur la santé du canton Berne

L'inégalité des chances en santé

Conférence de presse du 19 février 2010

Sommaire

- 
-
- 
- (1) Introduction
 - (2) Principaux résultats: mortalité
 - (3) Principaux résultats: enfants et adolescents
 - (4) Principaux résultats: adultes

Principales sources



- (1) Health Behaviour in School-Aged Children
(ISPA, 2006): N=1'279
- (2) Enquête suisse sur la santé
(OFS, 2007): N=2'369
- (3) Swiss National Cohort
(IMSP, 2001-2005):
N=689'515 (population) et 42'478 (nombre de décès)

Swiss National Cohort



RFP
2000

Décès du Canton de Berne, âgée de 25 à 94 ans,
recensés dans le cadre du recensement 2000 de la
population, N=42'478

5.12.2000

31.12.2005



Espérance de vie et mortalité



Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé dans le canton de Berne 2007

Espérance de vie en bonne santé dans le canton de Berne de 1992 à 2007, à la naissance et à l'âge de 65 ans

	Espérance de vie		Espérance de vie en bonne santé	Hausse depuis 1992
	En nombre d'années			
Hommes				
À la naissance	79.5		69.7	+ 6.4
À 65 ans	18.7		12.6	+ 1.0
Femmes				
À la naissance	84.2		69.6	+2.2
À 65 ans	22.1		14.1	+ 3.0

Source: OFS (Enquête suisse sur la santé 1992, 2007; Mortalité, Espop 1992, 2007)

Evaluation: SAP/OES



Espérance de vie selon la formation et le sexe dans le canton de Berne 2001-2005

Espérance de vie à 30 et à 65 ans selon la formation scolaire

En nombre d'années				
	Primaire	Secondaire	Tertiaire	Différence tertiaire – primaire
Hommes				
À 30 ans	46.6	49.5	52.1	+ 5.5
À 65 ans	16.3	18.0	19.5	+ 3.2
Femmes				
À 30 ans	53.2	55.0	55.8	+ 2.6
À 65 ans	20.8	21.9	22.7	+ 1.9

Source: Swiss National Cohort, IMSP, Université de Berne



Mortalité dans le canton de Berne

Relation entre le niveau de formation et la mortalité de 2000 à 2005 dans la population bernoise âgée de 25 à 94 ans, (SNC, N = 42 478); indépendamment de l'âge, du sexe, de la catégorie socioprofessionnelle, de l'état civil et de l'origine



Risque relatif	Tertiaire	Secondaire	Primaire
Toutes causes de décès	1	1,18 *	1,35 *
Cancers	1	1,12 *	1,24 *
Maladies cardiovasculaires	1	1,23 *	1,38 *

Source: Swiss National Cohort, IMSP, Université de Berne

* Significativité statistique 95%



La santé des enfants et des adolescents




Santé des enfants dans le canton de Berne selon leur origine sociale

- *Manque de données sur la santé selon l'origine sociale dans le canton de Berne*
- *Médecine scolaire à l'école enfantine, en quatrième et en huitième (→ aucune indication sur le contexte social, exception: le service sanitaire de la ville de Berne)*
- *Données internationales: étude KiGGS (Kinder- und Gesundheitssurvey en Allemagne, www.kiggs.de)*





Graphique 1: Activité physique des 11-15 ans en relation avec l'aisance financière familiale et le sexe (HBSC canton de Berne, 2006)



Bien-être psychique Durant la semaine écoulée, je me suis ...	Famille			Significa- tivité statistique
	Peu aisée	Moyenne ment aisée	Très aisée	
Garçons				95%
senti en forme et bien dans ma peau	75.0	77.7	87.0	**
senti seul	3.3	4.7	2.7	n.s.
Filles				
senti en forme et bien dans ma peau	56.1	75.1	79.5	**
senti seul	13.8	5.5	5.8	*


(HBSC Kt. Bern, 2006)

La santé des adultes en âge de travailler




Canton de Berne


Part de la population du canton de Berne en âge de travailler souffrant régulièrement de maux de dos, de maux de tête ou de douleurs articulaires
(Enquête suisse sur la santé 2007; N= 605)




Part de la population du canton de Berne en âge de travailler souffrant de forts maux de dos, maux de tête ou douleurs articulaires, dans les deux groupes extrêmes de situation sociale (Enquête suisse sur la santé 2007; N= 605)




Relation entre le statut social et le risque de souffrir de forts maux de dos: population bernoise adulte en âge de travailler (ESS, 2007, en valeurs ajustées des effets d'âge et de sexe; N = 1 484)




Fréquence de la surcharge pondérale (BMI > 25) et de l'obésité (BMI > 30): population bernoise adulte en âge de travailler, par sexe (N = 1 476)




Part de la population du canton de Berne en âge de travailler en surpoids (BMI > 25) dans les deux groupes extrêmes de situation sociale (Enquête suisse sur la santé 2007; N= 605)




Relation entre le statut social et le risque de surcharge pondérale et d'obésité: population bernoise adulte en âge de travailler (ESS, 2007, valeurs ajustées des effets d'âge et de sexe; N = 1 476)




Fréquence des détresses et maladies psychiques: population bernoise adulte en âge de travailler (ESS, 2007)




Part de la population du canton de Berne en âge de travailler souffrant d'une détresse psychique profonde, d'une dépression cliniquement significative ou de troubles du sommeil sévères dans les deux groupes extrêmes de statut social (ESS,2007; N = 605)




Fréquence des détresses et maladies psychiques: population bernoise adulte en âge de travailler (ESS, 2007)



Relation entre les déterminants sociaux et la détresse psychique profonde: population bernoise masculine en âge de travailler (ESS, 2007, ajusté des effets d'âge et de sexe; N = 667)



Relation entre les déterminants sociaux et la détresse psychique profonde: population bernoise féminine en âge de travailler (ESS, 2007, ajusté des effets d'âge et de sexe; N = 758)



Merci de votre attention!

